

# Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

## RESULTATS DU SONDAGE



### Déroulement de l'intervention dans les classes :

Distribution des questionnaires par des élèves déguisés en préservatifs. Les élèves les remplissent, ils sont collectés et traités par trois classes du lycée : VAM20, BCP20 et MDS21. Distribution de la réponse aux questions. Explications et discussions avec les élèves, réponse à leurs interrogations et apport d'informations.

Les pourcentages sont calculés sur les réponses exprimées.

### 1/ Vous êtes :

Un garçon	une fille
(68)	(240)
22%	78%

308 élèves ont rempli le questionnaire.

La répartition au sein du lycée est de 18% de garçons. Dans le panel sondé les garçons sont légèrement sur-représentés, certaines sections plus « féminisées » étant en stage.

### 2/ En quelle année a-t-on identifié le SIDA ?

1951	1971	1981	1991
(67)	(124)	(98)	(13)
21.75%	40.26%	<b>31.82%</b>	4.22%

L'objectif de cette question n'est pas de vérifier précisément l'exactitude de la date auprès des élèves mais de situer approximativement la période de l'apparition... ni un mal antédiluvien, ni un mal nouveau.

### 3/ Chaque année, dans le monde, le pourcentage des 12 - 25 ans dans la population contaminée par le virus VIH, est de ? :

20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
(27)	(98)	(82)	(54)	(44)	(3)
8.77	31.82%	26.62%	<b>17.53%</b>	14.29%	0.97%

Les élèves sont-estiment la part des 12-25 ans contaminés chaque année. La contamination VIH n'est pas un fait d'adultes, le jeunesse ne protège pas ! la première fois peut être la mauvais...

**5 000 nouveaux cas en France par an, 40 000 personnes (estimation) porteuses sans le savoir...**

**4/ Quel est le pourcentage de personnes porteuses du virus VIH dans le monde qui ignorent l'être ?**

30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
(105)	(101)	(43)	(35)	(16)	(6)	(2)
34.09%	32.79%	13.96%	11.36%	5.19%	<b>1.95%</b>	0.65%

Elles ignorent l'être car il n'y a AUCUN symptôme jusqu'à ce que l'on soit atteint de la maladie « opportuniste » : 6 mois, 1 an, 5 ans... après la contamination.

**5/ En France, dans la population contaminée par le virus VIH le pourcentage des femmes est de :**

30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	Sans-réponse
(57)	(149)	(61)	(38)	(2)	(1)
18.57%	48.53%	<b>19.87%</b>	12.38%	0.65%	

Les élèves pensent majoritairement que les hommes sont les plus touchés par la contamination. Autre idée reçue à combattre.

**6/ En France, 150 000 personnes sont séropositives (infectées par le virus VIH), selon vous quelle est la catégorie de population la plus touchée ?**

Homosexuels	Hétérosexuels	Toxicomanes	Transfusés	Accidentellement	Sans-réponse
(92)	(89)	(78)	(23)	(21)	(5)
30.36%	<b>29.37%</b>	25.74%	7.59%	6.93%	

Encore une autre idée reçue à combattre ; la majorité des contaminations se produisent lors de rapports homme/femme (hétérosexuel) ; 50% en France, 70% dans le mode. L'hétérosexualité ne protège pas.

**En France :**

- **50 % hétérosexuels (et 30 % de femmes)**
- **30 % homosexuels**
- **12 % toxicomanes**
- **8 % « autres » (transfusion, accidentellement)**

**7/ Parmi les actes suivants, lesquels vous semblent à risques pour être contaminé par le virus VIH ou par une autre Infection Sexuellement Transmissible (IST) ?**

Rapports sexuels	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>(308) 100%</b>
Etre piqué par un moustique	<input type="checkbox"/>	(45) 14.61%
Aller à la piscine	<input type="checkbox"/>	(19) 6.17%
Utiliser des WC publics	<input type="checkbox"/>	(58) 18.83%
Serrer la main	<input type="checkbox"/>	(9) 2.92%
Injection de drogue par voie intraveineuse	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>(274)88.96%</b>
Partager ses affaires ou son téléphone	<input type="checkbox"/>	(0) 0%
Se masturber	<input type="checkbox"/>	(33) 10.71%
S'embrasser	<input type="checkbox"/>	(36) 11.69%
Caresser son (sa) partenaire	<input type="checkbox"/>	(13) 4.22%

Toutes les croyances fausses sur le mode de transmission du VIH ont la « dent dure »...

**8/ Parmi les liquides corporels suivants, quels sont ceux qui présentent un risque pour être contaminé par le VIH ?**

Sang	Salive	Sperme
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(301)	(37)	(305)
<b>97.73%</b>	12.01%	<b>99.03%</b>
Sécrétions vaginales	Liquide séminal	Sueur
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(182)	(101)	(0)
<b>59.09%</b>	<b>32.79%</b>	0%
Larmes	Urine	Lait maternel
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(0)	(28)	(74)
0%	9.09%	<b>24.03%</b>

**9/ Lors d'un rapport sexuel, quel(s) moyen(s) de protection est (sont) obligatoire(s) pour éviter une contamination par le virus du SIDA ?**

Préservatif : (254)	83.28%
Préservatif féminin : (9)	2.95%
Pilule : (12)	3.93%
Pilule du lendemain : (6)	1.97%
Diaphragme : (1)	0.33%
Dépistage : (11)	3.61%
Abstinence : (3)	0.98%

Lors des discussions avec les classes après collecte des questionnaires les élèves ont montré qu'ils n'avaient pas confondus protection contre les IST et contraception ; les personnes ayant répondu la « pilule » étaient persuadées que celle-ci protégeait des IST...

**10/ Pensez-vous (ou avez-vous) utiliser(é) un préservatif dès votre tout premier rapport sexuel ?**

Oui	non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(230)	(72)
<b>76.16%</b>	23.84%

Avant l'information,  $\frac{1}{4}$  des élèves a eu (ou aurait eu) des relations non protégées... si l'on considère les résultats de l'évaluation après l'intervention, on peut considérer que  $\frac{1}{4}$  des élèves ont eu une ou plusieurs relations non protégées...

**11/ Quelles autres infections sont sexuellement transmissibles ?**

Non réponse : (139)

Hépatite : (49)	28.99%
Herpès : (23)	13.61%
Infections urinaires : (11)	6.51%
« MST » : (24)	14.20%
Mycoses : (27)	15.98%
Mononucléose : (17)	10.06%
Syphilis : (14)	8.28%
Cancer : (11)	6.51%
Morpions : (8)	4.73%
Grippe aviaire : (19)	10.06%
« vache folle » : (4)	2.37%

Le nombre de non-réponse reflète le manque de connaissances en ce domaine ; la notion d'infection sexuellement transmissible est « floue » : cancer, morpions, grippe aviaire...

**12/ On peut avoir confiance en son (sa) partenaire :**

	Oui	Non	Non réponse
Si il (elle) porte un préservatif	(277) <b>90.52%</b>	(29) 9.48%	(2)
Quand il n'y a pas symptôme de maladie	(132) 43.56%	(171) <b>56.44%</b>	(5)
Si il (elle) est plus expérimenté(e) ou plus âgé(e)	(53) 17.26%	(248) <b>82.39%</b>	(7)

**13/ Vous êtes avec votre partenaire depuis 3 mois, il (ou elle) suggère une relation non protégée :**

Vous acceptez	Vous refusez	Non réponse
□ (77) 25.58%	□ (224) <b>74.42%</b>	□ (7)

Une relation de 3 mois dans les esprits de nos élèves fait d'elle une relation « sûre » et amène 25.58% d'entre eux à abandonner le préservatif sans mesure particulière.

**14/ Où vous procurez-vous (procuriez-vous) vos préservatifs ?**

distributeur (141) 47.80%	pharmacie (215) 72.88%	Supermarché (78) 26.44%	association (66) 22.37%
Autre personne (72) 24.41%	Infirmière scolaire (49) 16.61%	Non réponse (13)	

Le préservatif demeure quelque chose de tabou et de « honteux » ; on ne l'achète pas en supermarché et les chiffres suivants en attestent. Près de la moitié ne se les procurent pas par eux-mêmes.

**15/ Les procurez-vous (procureriez-vous) vous-mêmes ?**

Oui (167) 57.39%	Non (124) 42.61%	Non réponse (17)
------------------------	------------------------	---------------------

**16/ Si vous envisagiez (ou le faites déjà) de vous procurer des préservatifs par une autre personne, ce serait :**

Frère/sœur (98) 37.12%	parents (39) 14.77%	Adulte de la famille (76) 28.79%	Autre adulte (136) 52.14%
------------------------------	---------------------------	---	------------------------------------

